

Herramienta de manejo de la bronquiectasia

Esta guía puede ayudarle a hablar con su neumólogo sobre el tratamiento de la bronquiectasia, el establecimiento de objetivos terapéuticos y si la toma de BRINSUPRI una vez al día puede ser adecuado para usted.



¿Qué es BRINSUPRI?

BRINSUPRI es un medicamento con receta que se usa para tratar la bronquiectasia no relacionada con la fibrosis quística (non-cystic fibrosis bronchiectasis, NCFB) en adultos y niños a partir de los 12 años de edad. Se desconoce si BRINSUPRI es seguro y eficaz en niños menores de 12 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar BRINSUPRI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Ha recibido recientemente o tiene previsto recibir alguna vacuna viva atenuada.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si BRINSUPRI puede dañar al bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si BRINSUPRI pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante este período.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información para el paciente](#) en [BRINSUPRI.com](https://brinsupri.com).

Use estas preguntas como guía para prepararse para su próxima visita médica

Aquí hay algunas preguntas que puede hacerle a su neumólogo sobre BRINSUPRI:

☐ ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento con BRINSUPRI? ¿Puede ayudar a reducir las exacerbaciones?

☐ ¿Cómo decidimos si BRINSUPRI es adecuado para mí?

☐ ¿Cómo tomo BRINSUPRI?

☐ ¿Cuándo es previsible ver los resultados de BRINSUPRI?

☐ ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BRINSUPRI?

☐ ¿Existe algún programa de apoyo que me ayude a empezar con BRINSUPRI?

Estas son preguntas de muestra para ayudar a iniciar la conversación entre usted y su neumólogo. Esto no es, ni pretende ser, una evaluación médica, un examen, un asesoramiento, una consulta, un diagnóstico ni un tratamiento. Siempre consulte a su neumólogo sobre todos los asuntos médicos y relacionados con la salud.

Pregunte a su neumólogo sobre la reducción de las exacerbaciones de la bronquiectasia con BRINSUPRI.

¿Qué es BRINSUPRI?

BRINSUPRI es un medicamento con receta que se usa para tratar la bronquiectasia no relacionada con la fibrosis quística (NCFB) en adultos y niños a partir de los 12 años de edad. Se desconoce si BRINSUPRI es seguro y eficaz en niños menores de 12 años de edad.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de tomar BRINSUPRI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Ha recibido recientemente o tiene previsto recibir alguna vacuna viva atenuada.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si BRINSUPRI puede dañar al bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si BRINSUPRI pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante este período.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información para el paciente](#) en [BRINSUPRI.com](https://brinsupri.com).

La bronquiectasia (BE) es provocada por factores interrelacionados que pueden agravar los síntomas

El agravamiento de los síntomas puede ser signo de una exacerbación, y las exacerbaciones pueden provocar daño pulmonar.



Inflamación crónica de las vías respiratorias

Cuando el sistema inmunitario del cuerpo trata de eliminar la infección y resolver la inflamación de los pulmones, el proceso puede provocar **irritación, hinchazón o inflamación crónicas**.



Infección pulmonar

El aumento de la mucosidad crea un **entorno propicio para el crecimiento de bacterias**. Esto puede provocar infección, inflamación y daño crónicos.




Dificultad para eliminar la mucosidad

A medida que la mucosidad se acumula en las vías respiratorias, resulta **difícil de eliminar**, lo que crea un entorno propicio para el crecimiento de bacterias.



Daño pulmonar

En la BE, las vías respiratorias se presentan **dilatadas y dañadas de manera anormal**, lo que dificulta la eliminación de la mucosidad de las vías respiratorias.



Trabaje con su neumólogo para crear un plan de tratamiento adecuado para usted.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. No cambie ni interrumpa sus medicamentos a menos que su proveedor de atención médica se lo indique.

BRINSUPRI puede causar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Problemas dermatológicos.** Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier síntoma nuevo en la piel. Es posible que su proveedor de atención médica lo remita a un dermatólogo para un examen, de ser necesario.
- **Problemas dentales.** Hágase controles dentales regulares mientras toma BRINSUPRI. Cepílese y limpie los dientes según las recomendaciones de su dentista. Informe a su proveedor de atención médica y comuníquese con su dentista si experimenta nuevos síntomas en las encías (gingivales) o los dientes (dentales).

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información para el paciente](#) en [BRINSUPRI.com](https://brinsupri.com).

Análisis de la bronquiectasia (BE) con su médico

Las estrategias de tratamiento para abordar los principales factores de la BE pueden incluir:



Exacerbaciones asociadas con la inflamación por BE

- BRINSUPRI de una sola toma diaria, un tratamiento para personas a partir de los 12 años con bronquiectasia no relacionada con la fibrosis quística



Infección pulmonar

- Antibióticos



Dificultad para eliminar la mucosidad

- Medicamentos mucolíticos
- Broncodilatadores
- Técnicas de depuración de las vías respiratorias



Daño pulmonar

- Rehabilitación pulmonar
- Broncodilatadores
- Cirugía

Otras preguntas para hacerle a su médico:

- | | |
|---|--|
| ☐ ¿Cómo le aviso si tengo una exacerbación? | ☐ ¿Qué cambios debo hacer en mi estilo de vida? |
| ☐ ¿Cómo puedo reducir las exacerbaciones de BE? | ☐ ¿Soy candidato para una rehabilitación pulmonar? |
| ☐ ¿Qué tipo de depuración de las vías respiratorias debo hacer y con qué frecuencia? | ☐ ¿Cómo puedo encontrar un grupo de apoyo para conectarme con otros pacientes con BE? |
| ☐ Otro: _____ | |



Para obtener más información sobre BRINSUPRI, escanee el código QR o visite [BRINSUPRI.com](https://www.brinsupri.com).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

Efectos secundarios frecuentes de BRINSUPRI

Los efectos secundarios más frecuentes de BRINSUPRI incluyen infección de las vías respiratorias superiores, dolor de cabeza, erupción cutánea, piel seca, pequeñas áreas de engrosamiento de la piel (hiperqueratosis) y presión arterial alta (hipertensión).

Los efectos secundarios menos frecuentes incluyen anomalías en las pruebas de función hepática, caída del cabello (alopecia) y cánceres de piel.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BRINSUPRI.

Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en todo el documento y la [Información de prescripción](#) completa y la [Información para el paciente](#) en [BRINSUPRI.com](https://www.brinsupri.com).